

SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE

7. svibanj
2015

Branimir Jakšić, Vlatko Pejša, Slobodanka Ostojić Kolonić, Ika Kardum-Skelin, Sandra Bašić Kinda,
Božena Coha, Velka Gverić-Krečak, Radovan Vrhovac, Ozren Jakšić, Igor Aurer, Jasmina Sinčić-
Petričević, Antica Duletić-Načinović, Damir Nemet
za KROHEM KLL radnu skupinu

**KROHEM B-kLL
v.1. 2015**

OVAJ AMANDMAN JE KROHEM ODOBRILO 07-05-2015

5.12 PRVA LINIJA LIJEČENJA KLL (KROHEM v1 2015) 07-05-2015

Stadij	%*	Opće stanje	%	Molekulska citogenetika	%	Prva linija liječenja	
						Standard **	Alternative ***
Asimptomatski ; Binet:A-B ; Rai 0-II; TTM<9 (15)	33	Nevažno		Nevažno		Bez terapije (praćenje)	Klinički pokus
Binet C, Rai III-IV; TTM>15; ili prisutni simptomi - (prisutna indikacija za terapiju)	67	Dobro	33	Bez del(17p)	30	FCR (1) Bendamustin**** + Rituksimab	Klinički pokus
				Del(17p)	3	Ibrutinib Idelalisib + Rituksimab FCR HDMP + Rituksimab → AlloSCT (elektivno)	Klinički pokus CHOP + R DHAP + R HDDex + R OFAR
	67	Loše	67	Bez del(17p)	62	Klorambucil + Obinutuzumab (1) Klorambucil + Rituksimab Klorambucil + Ofatumumab Bendamustin**** + Rituksimab	Klinički pokus FCR reduc CVP + R, HD Klorambucila ± Pred
				Del(17p)	5	Ibrutinib Idelalisib + Rituksimab FCR reduc HDMP + Rituksimab	Klinički pokus

Smjernice za liječenje moraju dati opća načela terapije i ne mogu zamijeniti kritičko kliničko prosuđivanje o svakom pojedinom bolesniku.

*Postoci se temelje na zbirnim podacima iz zapadnih zemalja i iz Hrvatske. Postoci bolesnika s različitim općim stanjem i citogenetikom odnose se na liječene bolesnike. Dobro opće stanje = manje od 70 godina i CIRS skor manji od 6. Mlađi bolesnici s CIRS skorom od 6 i više te bolesnici stariji od 70 godina neovisno o CIRS skoru = Loše opće stanje.

**Standardna liječenja poredana su prema preferenciji, sva su 2A prema NCCN konsenzusu, liječenje najvišeg stupnja označeno je s (1).

***Klinički pokusi se preporučuju, jer smatramo da oni povisuju razinu skrbi.

****Bendamustin još nije formalno odobren u Hrvatskoj (ali je odobren u većini članica EU).

FCR (fludarabin, ciklofosfamid i rituksimab); R = rituksimab; Allo SCT = alogena transplantacija matičnih stanica; HDMP (visoke doze metilprednisolona); CHOP (ciklofosfamid, dokosubicin, vinkristin, prednison); DHAP (deksametazon, citarabin i cisplatin (CDDP)); HDDex (visoke doze deksametazona); OFAR (oksaliplatin, fludarabin, citarabin, rituksimab); CVP (ciklofosfamidyclophosphamide, vinkristine, prednison); HD Klorambucil (visoke doze klorambucila kontinuirano).

5.13 LIJEČENJE RELAPSA/REFRAKTORNE KLL (KROHEM v1 2015) 07-05-2015

Relaps	%* (FCR)	Opće stanje	%	Molekulska citogenetika	%	Liječenje nakon prve linije	
						Standard **	Alternative ***
Rani (< 3 godine) Refraktorna bolest (< 1 god)	30	Dobro	9	No del(17p)	7	Ibrutinib (1) Idelalisib + Rituksimab FCR (>18 mjeseci bez DP) Bendamustin**** + Rituksimab Fludarabin + Alemtuzumab***** (>12 mjeseci bez DP) HDMP + Rituksimab Ofatumumab	Klinički pokus CHOP + R DHAP + R OFAR →AlloSCT
						Ibrutinib Idelalisib + Rituksimab HDMP + Rituksimab Alemtuzumab ± Rituksimab	Klinički pokus →AlloSCT CHOP + R
	21	Loše	21	No del(17p)	15	Ibrutinib (1) Idelalisib + Rituksimab FCR reduc Bendamustin**** + Rituksimab Klorambucil + antiCD20 (koji nije priman u prvoj liniji) HDMP + Rituksimab	Klinički pokus Fludarabin + Alemtuzumab***** CVP + Rituksimab
						Ibrutinib Idelalisib + Rituksimab HDMP + Rituksimab	Klinički pokus
Kasni (> 3 godine)	70	Dobro & Loše	70			Ponoviti prvu liniju (ili izabrati između gornjih opcija)	Klinički pokus

Smjernice za liječenje u KLL relapsu su mnogo složenije nego u prvoj liniji, jer uz elemente koji su potrebni za prvu liniju liječenja treba voditi računa i o prethodno primljenoj terapiji (svaka terapije ima svoja obilježja) i o opaženom trajanju odgovora. Zbog toga kao operativna definicija ranog relapsa može uzeti PFS < očekivanog medijana za primjenjeno prethodno liječenje (Klorambucil+Rituksimab = 12 mjeseci, Klorambucil+Obinutuzumab = 24 mjeseca, FCR = 36 mjeseci).

*Postoci se temelje na najboljim publiciranim podacima FCR terapije (Tam CS et al, Blood 2014;124:3059). S manje efikasnim terapijama vjerojatnost relapsa u prve 3 godine se bitno povećava. Također se povećava udio bolesnika u lošem stanju i udio bolesnika s del(17p). Dobro opće stanje dobro = manje od 70 godina i CIRS skor manji od 6. Mlađi bolesnici s CIRS skorom od 6 i više te bolesnici stariji od 70 godina neovisno o CIRS skoru = Loše opće stanje.

**Standardna liječenja poredana su prema preferenciji, sva su 2A prema NCCN konsenzusu, liječenje najvišeg stupnja označeno je s (1).

***Klinički pokusi se preporučuju, jer smatramo da oni povisuju razinu skrbi.

****Bendamustin još nije formalno odobren u Hrvatskoj (ali je odobren u većini članica EU).

*****Alemtuzumab is withdrawn from market, but can be obtained free of charge from producer upon request.

FCR (fludarabin, ciklofosfamid i rituksimab); R = rituksimab; Allo SCT = alogena transplantacija matičnih stanica; HDMP (visoke doze metilprednisolona); CHOP (ciklofosfamid, dokosubicin, vinkristin, prednison); DHAP (deksametazon, citarabin i cisplatin (CDDP)); HDDex (visoke doze deksametazona); OFAR (oksaliplatin, fludarabin, citarabine, rituksimab); CVP (ciklofosfamid, vinkristine, prednison); HD Klorambucil (visoke doze klorambucila kontinuirano).