

## **FOLIKULARNI LIMFOM**

### **Ključni uključni kriterij:**

Bolesnici s FL gr 1-3A kojima je ovo 3. ili kasnija linija liječenja, a u najmanje jednoj su bili refraktorni na protu-CD20 monoklonsko protutijelo

-izostanak odgovora ili progresija bolesti manje od 6 mjeseci od zadnje doze  
rituksimaba ili obinutuzumaba

### **Naziv:**

“A phase I/II study of lutetium (<sup>177</sup>Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin<sup>®</sup>) antibody-radiонuclide-conjugate for treatment of relapsed non-Hodgkin lymphoma”

(Ispitivanje faze I/II lutecij (<sup>177</sup>Lu)-lilotomab satetraksetana (Betalutin<sup>®</sup>), protutijela konjugiranog s radionuklidom, za liječenje relapse non-Hodgkinovih limfoma)

Studija faze II

### **Terapija:**

Radioimunoterapija

### **Ustanove i kontakti:**

KBC Zagreb

prof. dr Igor Aurer [igor.aurer@kbc-zagreb.hr](mailto:igor.aurer@kbc-zagreb.hr)

dr Barbara Dreta [bdreta@gmail.com](mailto:bdreta@gmail.com)