

KRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA

Ključni uključni kriterij:

Bolesnici s KLL ili SLL koji su prekinuli liječenje nekim od inhibitora Brutonove tirozin kinaze 1. ili 2. generacije (ibrutinib, akalabrutinib, zanubrutinib) iz bilo kojeg razloga.

-bolesnici moraju imati indikaciju za početak liječenja

Naziv:

“ A Phase 3 Open-Label, Randomized Study of LOXO-305 versus Investigator’s Choice of Idelalisib plus Rituximab or Bendamustine plus Rituximab in BTK Inhibitor Pretreated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (BRUIN CLL-321)”

(Randomizirano, otvoreno ispitivanje faze 3 lijeka LOXO-305 u odnosu na ispitivačev odabir idelalisiba plus rituksimaba ili bendamustina plus rituksimaba u liječenju kronične limfocitne leukemije / limfoma malih stanica prethodno liječenih inhibitorom BTK-a (BRUIN CLL-321), LOXO-BTK-20020)

Studija faze III

Terapija:

Kontrolna grana: Bendamustin + rituksimab ili idelalisib + rituksimab (po izboru ispitivača)

Eksperimentalna grana: pirtobrutinib (inhibitor BTK 3. generacije)

Ustanove i kontakti:

KBC Zagreb

prof. dr Igor Aurer

igor.aurer@kbc-zagreb.hr

dr Barbara Dreta

bdreta@gmail.com

KBC Split

dr Davor Galušić

davorgalusic@net.hr